DLP 10-6-63 225985

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

Poste 93)
(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, 2, rue de l'Hôpital Militaire

STRASBOURG.

C. C. P.: STRASBOURG 55-08-86

ABONNEMENT ANNUEL

15.- F.

7 Juin 1963

Supplément n° 1 du Bulletin du mois de Juin 1963.

/Avertissement/

VIGNE

MILDIOU

A la suite des pluies orageuses de ces derniers jours, un traitement anti-mildiou est conseillé sur l'ensemble du vignoble. Cette application devra être réalisée avant le 11 Juin.

VERS DE LA GRAPPE - OIDIUM

Tenir compte des recommandations données dans notre note du 4 Juin.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DES POMMIERS ET DES POIRIERS

Les contaminations par ascospores sont encore possibles.

Compte tenu des dangers d'infections primaires et des repiquages par conidies en cette période orageuse, une nouvelle application fongicide devra être réalisée dans la période du 11 au 13 Juin.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES (Climat plaine d'Alsace)

On note une assez forte activité du Carpocapse dans la plupart des secteurs arboricoles de plaine et les premières pontes sont observées depuis quelques jours.

Ajouter un produit insecticide à la bouillie anti-tavelure de façon à neutraliser les jeunes larves avant leur pénétration dans

les fruits.

Dans les situations

Dans les situations retardées (zone montagneuse notamment) ce traitement pourra être décalé d'une huitaine de jours.

Pour le choix des produits, se reporter à la liste des spécialités conseillées en 1963.

/Information/

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE (cultures de plaine)

DORYPHORE

Les premières éclosions vont se produire incessamment. Un traitement insecticide devra être appliqué lorsque les jeunes larves atteindront la grosseur d'un grain de blé.

Les Contrôleurs, J. BERNARD et C.GACHON.

L'Inspecteur, J. HARRANGER.

147

## STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DE

#### STRASBOURG

le 7 JUIN 1963.

## HOUBLON.

### MILDIOU

Les conditions actuelles sont favorables aux contaminations et il apparaît nécessaire de renouveler la protection des houblonnières.

Exécuter dès réception un nouveau traitement fongicide en utilisant l'un des produits conseillés précédemment.

Il est indispensable d'éliminer les pousses spiciformes qui constituent les premiers foyers d'infection.

Bien soigner les pulvérisations de façon à ce que cellesci atteignent toutes les feuilles sur leurs deux faces.

Après de fortes pluies, la protection doit être renouvelée automatiquement.

Les contrôleurs, J. BERNARD et C.GACHON.

L'Inspecteur, J. HARRANGER.

